

**PROVA APERFEIÇOAMENTO EM DERMATOLOGIA – UNITAU  
2022**

**1ª Etapa – 20/01/2022**

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Parte 1 - Dissertativa**

**4 questões – 5 (cinco) pontos cada**

**Questão 1**

Homem, 68 anos, branco, trabalhador rural, natural e procedente de Cunha/ SP.  
Ao exame: Úlcera, 2 cm, fundo limpo, bordas elevadas, localizada no antebraço direito.

- A) Diagnóstico
- B) Três diagnósticos diferenciais
- C) Tratamento(s)

**Questão 2**

Sífilis

- A) Tríade de hutchinson
- B) Tratamento da sífilis secundária
- C) Quanto ao VDRL explique: FALSO POSITIVO e FALSO NEGATIVO

**Questão 3**

Herpes simples

- A) Manifestações clínicas
- B) O que encontramos no citodiagnóstico de Tzank?
- C) O que é eczema herpético?

**Questão 4**

Cite duas manifestações dermatológicas da tuberculose cutânea e descreva o exame dermatológico.

## Parte 2 – Múltipla Escolha

### 30 questões – 1 (um) ponto cada

1- Qual antibiótico não deve ser associado à isotretinoína e qual o possível efeito colateral dessa associação:

- A) cefalosporinas - hepatite medicamentosa
- B) cefalosporina - hidrocefalia de pressão normal
- C) tetraciclina - hipertensão intracraniana
- D) beta-lactâmicos - fotossensibilidade
- E) quinolonas – fotossensibilidade

2- Assinale a correspondência correta:

- A) nevo sebáceo
- B) tricoblastoma/ tricoepitelioma
- C) hiperplasia sebácea

1. Pápulas amareladas com depressão central na face e às vezes, tronco. São benignas.

2. Mal-formação congênita folicular, sebácea e apócrina, campo fértil para o desenvolvimento de neoplasias anexiais secundárias.

3. Pápulas ou nódulos cor da pele na face e tronco, principalmente no nariz. Podem ser únicos ou múltiplos (Doença de Brooke).

- A) A2/ B3/ C1
- B) A3/ B3/ C1
- C) A2/ B1/ C3
- D) A1/ B3/ C2
- E) A1/ B2/ C3

3- Descamação interdigital no 4o e 5o pododáctilos com fissura há cerca de 10 dias. Paciente refere prurido. Qual a principal hipótese diagnóstica e o tratamento?

- A) Tinea interdigitalis - corticoide + antifúngico tópico
- B) Trauma - antibiótico tópico
- C) Trauma - corticoide + antibiótico tópico
- D) Tinea interdigitalis - antifúngico tópico
- E) Tinea com infecção bacteriana secundária - corticoide + antibiótico + antifúngico tópico

4- A presença de nervo espessado emergindo de lesão de placa eritematosa com alteração de sensibilidade e de sudorese, configura a lesão em raquete. Tal lesão é típica da seguinte forma de hanseníase:

- A) Indeterminada
- B) Tuberculoide
- C) Dimorfa
- D) Virchoviana
- E) Tal lesão não pertence à hanseníase

5- Em relação ao Teste de Mitsuda, assinale a correta:

- I. É um exame com valor diagnóstico e prognóstico
- II. A leitura é realizada após 72 horas da aplicação
- III. Avalia a imunidade celular específica de um indivíduo contra o bacilo de Hansen
- IV. O teste de Mitsuda negativo significa que o paciente não entrou em contato com o bacilo

V. O teste de Mitsuda positivo significa que o paciente tem certo grau de resistência à infecção.

- A) II e III estão corretas
- B) I, II e IV estão incorretas
- C) Apenas V está correta
- D) Todas estão corretas
- E) II, III e IV estão incorretas

6- O que se entende por espaços intertriginosos?

- A) Mucosas próximas à pele
- B) Áreas cutâneas revestidas de pelos
- C) Superfícies cutâneas com comprometimento da evaporação
- D) Pregas cutâneas
- E) NDA

7- Tratamento dermatológico que compreende a utilização de luz e cromóforos:

- A) Crioterapia
- B) Laserterapia
- C) Wavetronic
- D) Hyfrecator
- E) Eletrocautério simples

8- Na etiopatogenia dos Pênfigos o que significa o termo acantólise?

- A) Perda de adesão dermo-epidérmica
- B) Lise e clivagem a nível de camada córnea
- C) Perda da adesão entre as células da camada de Malpighi
- D) Perda da adesão entre os queratinócitos da camada basal
- E) Lise dos hemidesmossomos

9- Quanto aos inibidores da IL17 (Secuquinumabe/ Ixequizumabe), qual seu principal efeito adverso?

- A) Conjuntivite
- B) Reação anafilática
- C) Candidíase
- D) Herpes zoster
- E) NDA

10- População que apresenta maior incidência de CEC em relação ao CBC:

- A) negróides
- B) trabalhadores rurais
- C) caucasianos
- D) HIV positivos
- E) transplantados

11- São critérios diagnósticos da Dermatite Atópica, exceto:

- A) história familiar ou pessoal de atopia e dermatografismo branco
- B) pitiríase alba e queratose pilar
- C) Prega de Dennie Morgan e ictiose
- D) palidez centro facial e escurecimento orbitário
- E) hiperlinearidade palmar e pitiríase rósea

12- Paciente do sexo feminino, 50 anos, que compareceu ao serviço médico, com queixa de vermelhidão nas áreas expostas ao sol, dificuldade de extensão dos membros, dores no corpo e ao exame dermatológico foi observado: eritema, edema

periorbitário e regiões malares, poiquiloderma em V do decote, dorso superior com vasos dilatados nas dobras ungueais posteriores. Pensar em qual patologia e que exames pedir?

- A) Hanseníase – Baciloscopia, biópsia, FAN, função hepática.
- B) Esclerodermia – FAN, CPK, Aldolase
- C) Lupus – FAN, CPK, Aldolase, biópsia.
- D) Dermatomiosite – CPK, aldolase, TGO, TGP, FAN, eletromiografia, biópsia muscular/pele.
- E) NDA

13- No defeito ectodérmico congênito anidróico (Síndrome de Christ-Siemens-Touraine) estão presentes, exceto:

- A) Anidrose
- B) Tricorrexe nodosa
- C) Hipoplasia dentária (principalmente caninos e incisivos)
- D) Hipotricose e oncodistrofias
- E) Maior frequência no sexo masculino

14- A Leucoplasia Pilosa Oral encontrada nos indivíduos HIV positivos é causada por qual agente etiológico?

- A) HSV 8
- B) Herpes simples
- C) Citomegalovirus
- D) Epstein barr
- E) HSV 10

15- Sinais diagnósticos específicos podem ajudar no diagnóstico de determinados distúrbios. Relacione as doenças com seus sinais diagnósticos adequados e assinale alternativa que contempla a sequência correta.

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1) Sinal de Darier     | A. Psoríase             |
| 2) Patergia            | B. Urticaria pigmentosa |
| 3) Fenômeno de Koebner | C. Pioderma gangrenoso  |
| 4) Sinal de Nikolsky   | D. Eritrasma            |
| 5) Luz de Wood         | E. Sarcoidose           |
| 6) Diascopia           | F. Pênfigo vulgar       |

- A) 1B/ 2C/ 3A/ 4F/ 5D/ 6E
- B) 1A/ 2C/ 3E/ 4D/ 5B/ 6F
- C) 1A/ 2D/ 3B/ 4C/ 5F/ 6E
- D) 1B/ 2F/ 3E/ 4C/ 5A/ 6D
- E) NDA

16- O exame microscópico das condições cutâneas revelam achados diagnósticos. Relacione cada condição mórbida, com a prova diagnóstica adequada e assinale a alternativa correta:

- A) Coloração de Gram
- B) Hidróxido de Potássio
- C) Esfregaço de Tzanck
- D) Ácido Periódico de Schiff (PAS)

1. Tinha do pé
2. Herpes Zoster
3. Eritrasma
4. Lupus Eritematoso

- A) A2/ B1/ C3/ D4
- B) A1/ B3/ C2/ D4
- C) A1/ B3/ C4/ D2
- D) A3/ B2/ C1/ D4
- E) A3/ B1/ C2/ D4

17- Em qual doença infecto-contagiosa do tipo exantemático a administração de penicilina constitui o tratamento de escolha?

- A) Rubéola
- B) Sarampo
- C) Escarlatina
- D) Eritema infeccioso
- E) Roséola infantum

18- Quais são as doenças atribuídas à picada de carrapato?

- A) Borreliose, Leishmaniose
- B) Leishmaniose, Tifo exantemático
- C) Atrofodermia de Pasini-Pierini, Sarcoidose
- D) Eritema crônico migratório, Acrodermatite crônica atroficante
- E) NDA

19- Homem, 40 anos, apresentando em região genital placa hipocrômica, atrófica, endurecida, há aproximadamente 1 ano. Dificuldade para urinar.

Qual sua hipótese diagnóstica?

- A) Balanite xerótica obliterante
- B) Eritroplasia de Queyrat
- C) Balanite plasmocitária de Zoom
- D) Leucoplasia
- E) Candidíase

20- Medicamentos capazes de desencadear erupção acneiforme:

- A) Halogenados (Iodo, Bromo)
- B) Vitamina B12 (cianocobalamina)
- C) Isoniazida
- D) Anticoncepcionais orais
- E) Todas as anteriores

21- Cinco dias após o início de uma amigdalite acompanhada de artralgia, um paciente de 32 anos vem a apresentar lesões cutâneas simetricamente distribuídas na face de extensão de ambos os braços e no dorso das mãos. São pápulas e placas, eritematosas, bem delimitadas, salientes (semelhante a urticas) e cujo centro se apresenta discretamente deprimido e violáceo ou hemorrágico (aspecto em alvo). Qual dermatose é mais provável?

- A) Dermatose hemorrágico-pigmentada
- B) Exantema medicamentoso, maculo-papuloso
- C) Eritema polimorfo
- D) Psoríase exantemática
- E) Eritema nodoso

22- A estomatite moriforme de Pupo, é encontrada na:

- A) Leishmaniose tegumentar americana
- B) Esporotricose disseminada
- C) Rinosporidiose
- D) Feohifomicose
- E) Paracoccidioidomicose

23- Recém-nascido apresentando na língua, mucosa jugal e palato áreas esbranquiçadas salpicadas com tendência à confluência e facilmente removível com espátula. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Difteria
- B) Liquen plano das mucosas
- C) Manchas de Koplik
- D) Candidíase
- E) Leucoplasia pilosa oral

24- Dermatose na qual se observa formação de bolhas intraepidérmicas:

- A) Eritema multiforme
- B) Dermatite herpetiforme
- C) Epidermólise bolhosa distrófica
- D) Penfigóide bolhoso
- E) Pênfigo vulgar

25- Qual dos sinais e sintomas abaixo enumerados não é característico da eritromelalgia?

- A) Evolução crônica
- B) Dor
- C) Manifestação paroxística
- D) Vasodilatação
- E) Comprometimento vascular

26- Clinicamente a Sífilis é classificada em diferentes estágios. Qual a manifestação característica da Sífilis primária?

- A) Condiloma plano
- B) Gomas
- C) Roséola sífilítica
- D) Cancro duro
- E) Alopecia em clareiras

27- Dos corticoides, qual induz maior catabolismo muscular?

- A) Triancinolona
- B) Betametasona
- C) Hidrocortisona
- D) Prednisona
- E) Dexametasona

28- Assinale a alternativa incorreta sobre as complicações após preenchedores como o ácido hialurônico na pele:

- a) A equimose é a principal complicação. Ocorre minutos a horas após a injeção do preenchedor devido à laceração de vasos sanguíneos e compressão imediata deve ser aplicada no local assim que o sangramento for detectado.
- b) O efeito Tyndall pode acontecer quando o preenchedor é aplicado muito profundamente na pele e a hialuronidase é o tratamento recomendado.

- c) Neovascularização pode se formar no local da injeção dérmica de preenchedor após dias a semanas. Regride espontaneamente em 3-12 meses ou pode ser tratada com luz intensa pulsada.
- d) A hiperpigmentação pós inflamatória ocorre mais frequentemente nos fototipos IV-VI e deve ser diferenciada do depósito de hemossiderina pós-hematoma.
- e) O edema pós-preenchimento acontece horas após o procedimento e não apresenta sinais inflamatórios, podendo ser tratado com resfriamento local.

29- Menina de 1 ano com quadro de rarefação capilar em todo o couro cabeludo desde o nascimento. No exame dermatológico foram observadas hastes capilares curtas e finas, mais evidentes na região occipital. A tricoscopia do couro cabeludo revelou fios com estreitamentos periódicos com intervalos regulares, dando ao cabelo a aparência das contas de um rosário.

Qual o diagnóstico?

- A) Tricotodistrofia
- B) Pili torti
- C) Moniletrix
- D) Woolly hair
- E) Pili annulati

30- Paciente masculino, 12 anos, com diagnóstico de síndrome mielodisplásica e submetido a transplante de medula óssea, foi encaminhado para a dermatologia por apresentar verrucose generalizada. No exame dermatológico apresentava pápulas verrucosas, queratósicas, esbranquiçadas e com bordas regulares, localizadas na ponta nasal, mãos, cotovelos e membros inferiores. Nos joelhos e no pé direito, principalmente à direita, as lesões verrucosas confluíam formando grandes placas. Lesões mucosas ausentes.

Esta condição é causada por qual agente etiológico?

- A) Herpes simples vírus II
- B) Papilomavirus humano
- C) Citomegalovírus
- D) Vírus Epstein Barr
- E) Parapoxvírus